


## ¿Cómo pueden afectar los medicamentos a la capacidad para conducir?

Algunos medicamentos, incluso los que no precisan receta médica, pueden disminuir su capacidad para conducir de forma segura.

Debe prestar atención a los siguientes efectos adversos de los medicamentos que esté utilizando:

- Somnolencia
- Dificultad de concentración o para permanecer alerta
- Visión doble o borrosa
- Sensación de vértigo
- Disminución de reflejos: lentitud de reacción
- Falta de coordinación, sensación de inestabilidad
- Desvanecimientos, mareos

Siempre que comience a tomar un nuevo medicamento, aunque sea sin receta, incluidos los medicamentos u otros productos a base de plantas medicinales, pregunte al profesional sanitario sobre los riesgos de conducir mientras dure su tratamiento y consulte el prospecto.



## ¿Qué medicamentos pueden afectar a la capacidad para conducir?

Entre los medicamentos que pueden disminuir la capacidad para conducir cabe destacar los que se utilizan para tratar los trastornos del sueño, la ansiedad, la psicosis, la depresión, la epilepsia, el párkinson, el dolor, las migrañas, la demencia, las alergias, las afecciones oculares, la gripe y el catarro.

Pida siempre consejo a su médico o farmacéutico u otros profesionales sanitarios si está utilizando o va a utilizar alguno de estos medicamentos.

### ¿Qué medicamento toma?



### Así le puede afectar

Trastornos del sueño (hipnóticos)		somnolencia, disminución de la atención y disminución de la capacidad de reacción
Ansiedad (ansiolíticos)		somnolencia, disminución de la atención y disminución de la capacidad de reacción
Depresión (antidepresivos)		nerviosismo, ansiedad, somnolencia, alteración de la coordinación, visión borrosa
Gripe y catarro (antigripales y anticatarrales)		somnolencia
Dolor (analgésicos)		somnolencia, disminución de la capacidad de concentración y de reacción, mareo
Alergias (antialérgicos)		somnolencia, visión borrosa (colirios)
Migrañas (antimigrañosos)		somnolencia, mareos, debilidad
Afecciones oculares		visión borrosa
Psicosis (antipsicóticos)		somnolencia, mareo, agitación, cansancio
Epilepsia (antiepilépticos)		somnolencia, mareos, visión borrosa, fatiga, sensación de debilidad
Párkinson (antiparkinsonianos)		somnolencia, episodios repentinos de sueño, espasmos, visión borrosa, confusión
Fármacos usados para la diabetes		hipoglucemia
Antihistamínicos		somnolencia, capacidad de reacción reducida.